

1. Hepatitis A

In Nederland en West Europa komt de hepatitis A niet meer voor onder de algemene bevolking. Dit in tegenstelling tot Noord Afrikaanse landen, daar komt hepatitis A frequent voor.

Binnen de ziekenhuissetting is op bepaalde afdelingen sprake van een verhoogde kans op blootstelling. Dit geldt met name voor sommige functies op de Maag-, Darm- en Lever (MDL)- afdeling. Niet immune volwassenen, die besmet zijn met het hepatitis A-virus kunnen weken tot maanden ziekteverschijnselen hebben met daaropvolgend een langdurige herstelperiode met ernstige vermoeidheidsklachten. Besmette werknemers kunnen de ziekte overbrengen tijdens patiëntcontact of voedselbereiding. Vaccinatie is beschikbaar en biedt levenslange bescherming. Hepatitis A is geen onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma.

Primaire doelgroep: die groep medewerkers die bij endoscopische verrichtingen direct (via patiënten) of indirect (via patiëntmateriaal of instrumenten) met feces in aanraking kunnen komen. Daarnaast de groep 'overigen': alle medisch studenten en buitenlandstagiaires, alsmede medewerkers die om zakelijke redenen naar endemische gebieden reizen.

Beleid:

Medewerker volledig gevaccineerd:

Ja: geen actie

Nooit gevaccineerd:

Medewerkers uit de primaire doelgroep volledige schema, wat betekent tweemaal vaccineren op maand 0 en maand 6.

Voor medewerkers die beroepshalve naar endemische landen afreizen, worden geadviseerd een afspraak te maken op het reizigersspreekuur van de Arbodienst.

Medewerker is onvolledig gevaccineerd (een vaccinatie):

Een tweede vaccinatie.

4. Serologische screening:

Niet van toepassing. Een uitzondering is indien de werknemer afkomstig is uit een endemisch land en/of een periode van geelzucht heeft doorgemaakt en/of indien er sprake is van een gestoorde immuniteit.

5. Contra-indicaties vaccinatie:

Geen 'harde' contra-indicaties. Niet vaccineren tijdens zwangerschap of borstvoeding.
Medewerker vult vragenlijst DKTP/hepatitis A vaccinatie in

Conclusie: medewerkers uit de primaire doelgroep en de groep 'overigen' tweemaal vaccineren (maand 0 en maand 6).